

HERBICIDA

CLIBUT 20 EC

CIHALOFOP BUTIL

CONTROL: POST-EMERGENTE



EFECTO HERBICIDA, específico y selectivo de acción sistémica.

Específico contra las especies de género *echinochloa*.

Efectivo contra biotipos de *echinochloa* resistentes a herbicidas de uso común.

Selectivo al ser metabolizado en arroz a moléculas inactivas y en *echinochloa* se metaboliza a sustancias herbicidas.

DOSIS

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA	EPOCA Y FRECUENCIA
Arroz Oryza Sativa	Echinochloa colonum (Arrocillo) Echinochloa cruss-galli (Capin / Pata de gallo) Echinochloa oryzicola (Cola de caballo) Leptochloa filiformis (Cola de zorra) Paspalum pilosum (Paja peluda) Eleusine Indica (Pata de gallina) Digitaria sanguinalis (Guarda rocío) Rottboellia cochinchinensis (Caminadora) Ischaemum rugosom (Mazorquilla)	1-1.2 L/ ha	El producto debe ser aplicado sobre malezas emergidas en activo crecimiento

*Volumen de aplicación 400 L de agua/ha

FORMA DE APLICACIÓN

Debe aplicarse cuando el arroz se encuentra entre el estadio de 1-4 hojas y pleno ahijamiento y Echinochloa cruss-galli en estadio de 1-3 hojas o la Echinochloa con no más de 20 cm.

Antes de aplicar debe bajarse el nivel del agua, de forma que toda la Echinochloa quede fuera y mantener el nivel de agua de 24 -48 horas después de la aplicación.

MODO DE ACCIÓN

Herbicida post-emergente que es absorbido rápidamente por los tejidos de las malezas. Con movilidad por el floema y xilema, paraliza el crecimiento de raíces y partes aéreas en pocas horas. Lo síntomas son visibles a la semana y la maleza muere en 14-18 días.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Momento de aplicación y estado de la Maleza	Dosis (l/ha)
Aplicación temprana: Malezas 1-4 hojas	0,7 -1,2 L/ha
Aplicación normal: Malezas de 4 hojas a 1 macolla	1,2 -1,4 l/ha
Aplicación tardía: Malezas de más de 1 macolla	1,5 l/ha

Dependiendo del estado de la maleza puede realizar dos aplicaciones en post-emergencia a la maleza; la primera de 10-12 días después del trasplante) y la segunda de 29-30 días después del trasplante (tardía)



CLIBUT 20 EC (Nº Reg. 6749 de 30 de Abril de 2014)
HERBICIDA
CIHALOFOP BUTIL

* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.

PRESENTACIÓN

Botella de 1 Litro
Bidoncito de 5 L
Bidón de 20 L
Tambor de 200 L