

**HERBICIDA**

# FERPLET 7,5 EW

## FENOXAPROP P-ETHYL

### CONTROL: POST-EMERGENCIA



#### HERBICIDA GRAMINICIDA


- \* Actividad sistémica y por contacto.
- \* Se absorbe por las hojas y se transporta por la savia.
- \* Movimiento basípeto y acrópeto que le proporciona una acción completa.
- \* Impide la formación de células en los puntos de crecimiento.

#### SÍNTOMAS VISIBLES EN LA MALEZA:

- \* Reduce el contenido de clorofila.
- \* Inhibe la reacción de autodefensa.
- \* Rompe la membrana celular.
- \* Necrosa los tejidos merismáticos en 2-3 días.

#### BENEFICIOS:

- \* Control exhaustivo de gramíneas anuales y perennes.
- \* No es sensible a la luz del sol.





## DOSIS RECOMENDADA

0,7 - 1L/ ha

## CONTROL DE MALEZAS EN ARROZ

Cola de zorra (*Alopecurus myosuroides*)  
Arroz corto (*Leersia oryzois*)  
Paja Peluda (*Roboetia exaltata*)  
Alpiste, Avena loca (*Phalaris minor*, *Ph.paradoxa*)  
Pasto Caribe (*Eriochloa contracta*)  
Capím, Arroz silvestre (*Echinochloa crus-galli*)  
Arrocillo (*Echinochloa colonum*)

Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis*)  
Rabo de zorro, Paja amarilla (*Setaria pumila*, *S. viridis*)  
Plumilla, Paja de burro (*Leptochloa univernia*, *L. filiformis*)  
Pata gallina (*Eleusine indica* y *E. africana*)  
Zacate Johnson, Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense*, *S.bicolor*)  
Pasto guinea (*Panicum máximum*, *P. capilare*)  
Brachiaria – (*Brachiaria plantaginea*)

\*Volumen de aplicación 400 L de agua/ha

## MODO DE ACCIÓN

Herbicida post-emergencia

Actúa por contacto y por actividad sistémica transportándose por la savia y acumulándose en los meristemas. Se hidroliza en el interior de la planta impidiendo la formación de los ácidos grasos que forman la membrana celular, y la formación de células en los puntos de crecimiento

## MOMENTO DE APLICACIÓN

POST-EMERGENCIA  
(1 APLICACIÓN)

Se aplica a partir de la maleza en el estadio de 2 hojas y hasta que es visible la hoja bandera. Aprovechar las condiciones climáticas de alta humedad atmosférica y edáfica. Aplicar en las primeras horas de la mañana.

Evitar la aplicación si hay previsión de lluvia en las siguientes 24 horas.



FERPLET 7,5 EW (Nº Reg. 6746 de 30 de Abril de 2014)  
HERBICIDA  
FENOXAPROP P-ETHYL

\* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
\* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

\*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

\*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

\*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

\*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUALO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.

## PRESENTACIÓN

Botella de 1 Litro  
Bidoncito de 5 L  
Bidón de 20 L  
Tambor de 200 L