

HERBICIDA

MESUMET 60 WDG

METSULFURON METIL

CONTROL: POST-EMERGENTE



EFFECTO HERBICIDA:

- * ACCIÓN SISTÉMICA DESDE LA RAIZ A LOS MERISTEMOS.
- * CONTRA ANUALES, PERENNES DE HOJA ANCHA Y GRAMÍNEAS.
- * EFECTIVO PARA QUEMAS CON HERBICIDAS DE USO COMÚN (GLIFOSATO).
- * RECOMENDADO PARA PASTO EN MEZCLA CON 2,4 D.

DOSIS

*Volumen de aplicación 400 L de agua/ha

Cultivo:	Plaga:		Dosis:	
Arroz (Oryza sativa)	Anuales Chenopodium album, Ceniso Heteranthera limosa, Acacio Heteranthera infolia, Acacio	Desmodium tortuosum, Pega pega Solanum nigrum, Yerbamora Gallinsoga siliata, Pajarito Urticaurens, Pringamosa Capsellabursa-pastorilis, Kochia seoparia, Descurainiasophia, Viola arvensis, Matricaria recutita, Sonchus arvensis, Stellaria media, Salsola spp., Rumex obtusifolius, Polygonum lapathifolium, Polygonum convolvulus	Hoja ancha peremnes Carduus arvensi, Mimosa spp., Dormidera Sida acuta, Escoba Sida spinosa., Escoba amarilla	10-15 gramos/ha
Caña de azúcar (Saccharum officinarum)	Ipomoea spp, Batatilla Jussialini folia, Palo de Agua Murdania nudiflora, Piñita Eclipta alba, Botoncillo Portulaca oleracea, Ataraya			10-15 gramos/ha
Palma Africana (Elaeis Guineensis)	Caperonia palustris, Caperonia Amaranthus dubius, Amaranto o Bledo Euphorbia hiria, Uchuva Corchorus orinosensis, Euphorbia heterophylla, Commelina difusa, Ammania coccinea, Palo de agua		Gramíneas	20 gramos/ha
Pasto			Lolium perenne, Ischaemum rogosum Falsa caminadora	20-30 gramos

FORMA DE APLICACIÓN

Use siempre un surfactante para una mejor difusión del producto

ARROZ

Debe aplicarse con la maleza en el estadio de 4-5 hojas y no más de 35 días desde la emergencia.

CAÑA

Aplicar dirigido a la maleza y evitar la deriva a la cobertura del cultivo

PASTO

En mezcla con 2,4 D

MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicación post emergencia a razón de 10 g/ ha de forma general

Aplicación post-emergencia de 20 g/ ha en aplicación a pasto

Aplicación en quemas a la misma dosis en mezcla con herbicidas para este uso

Dependiendo del estado de la maleza puede realizar dos aplicaciones en post-emergencia a la maleza; la primera a los 15 días desde la emergencia de la maleza en las condiciones descritas) y la segunda al menos 21 días antes de la cosecha

MODO DE ACCIÓN

Herbicida post-emergente que es absorbido rápidamente por la raíz y traslocado de forma ascendente hacia los meristemos de las malezas. Paraliza el crecimiento de raíces y parte aérea. Lo síntomas son visibles en una semana.



MESUMET 60 WDG (Nº Reg. 6811 de 16 de Junio de 2014)

HERBICIDA
METSULFURON METIL

PRESENTACIÓN

Sobrecito de 10 g
Bolsa de 100 g

* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

*DESPUES DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.