

FUNGICIDA

ARTICOL DUO 60 WDG

PROPINEB Y HEXACONAZOL

**¡EL DÚO IMPARABLE!
MEZCLA DE UN FUNGICIDA MULTISITIO CON
UN FUNGICIDA SISTÉMICO**

 **GUADAGRO®**



BENEFICIOS DE LOS EFECTOS SINÉRGICOS DERIVADOS DE LA MEZCLA

- * Fungicida sistémico y multisitio, de aplicación foliar o al agua de riego en hortalizas, impide el desarrollo de conidias y se distribuye por el xilema a otras partes de la planta.
- * Fungicida traslaminar y de contacto con actividad preventiva, curativa y erradicante.
- * Dosis más baja de aplicación en campo, muy inferior a las dosis de cada compuesto cuando se utiliza por separado.
- * No se necesita ni alternar ni mezclar con otros fungicidas de acción diferente, con ARTICOL DUO no aparecen resistencias.

MODO ADE ACCIÓN

ARTICOL DUO 60 WDG es una combinación dual en mezcla de un fungicida altamente sistémico, Hexaconazol, otro fungicida de contacto multisitio, Propineb, actuando como protector, curativo y erradicante con fuerte acción expulorante y translaminar para el control de hongos basidiomicetos y ascomicetos. Absorbido por vía foliar y radicular actúa como fungicida preventivo y curativo con actividad sistémica y residual.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Generalmente la aplicación de ARTICOL DUO 60 WDG debe comenzar antes de la aparición de la enfermedad o en el inicio de la enfermedad. Repita las aplicaciones a intervalos de 8-12 días dependiendo de las condiciones climáticas y la severidad de la enfermedad.

Arroz: Se recomiendan de dos a tres aplicaciones, la primera poco antes del brote de las espigas, la segunda después de 15 días

DOSIS

575-675 g/ha

| CULTIVO | NOMBRE ENFERMEDAD |
|--|--|
| Arroz Oryza Sativa | Rhizoctonia (Rhizoctonia solani) Mancha marron (Helminthosporium Oryzae) Pyricularia, (Pyricularia Oryzae) Mancha foliar (Alternaria spp) |
| Papa Solanum tuberosum | Tizón temprano (Alternaria solani) Tizón tardío (Phytophthora infestans) |
| Chile Capsicum annum | Mancha foliar gris (Stemphylium solani) Mancha foliar (Septoria spp) |
| Tomate Lycopersicum esculentum | |
| Café Coffea arabica | Mancha foliar (Cercospora spp) Antracnosis (Colletotrichum spp.) Roya (Hemileia vastatrix) Ojo de gallo (Mycena citricolor) |
| Melon Cucumis melo Pepino Cucumis sativus Sandía Citrullus lanatus | Moho (Pseudoperonospora cubensis) |
| Banano Musa spp | Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) |



ARTICOL DUO 60 WDG, (N° Reg. 7714 de 30 de Diciembre de 2015)
FUNGICIDA
PROPINEB Y HEXACONAZOL

* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
 MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE
 DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL
 LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS
 REMANENTES.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 500 g
 Bolsa de 1 Kg
 Tambor de 25 Kg