

INSECTICIDA

AMUNT 30 SC

INDOXACARB

¡¡INSECTICIDA DE ÚLTIMO RECURSO!!

ESPECIFICO PARA ATAQUE DE PLAGA ANTES DE LA RECOLECCIÓN.



VENTAJAS

- AMUNT 30 SC posee rápida efectividad, así evita que el insecto siga alimentandose
- AMUNT 30 SC es larvicida y ovicida
- AMUNT 30 SC en caso de necesidad se puede usar en floración
- AMUNT 30 SC, en caso de necesidad se puede usar con el fruto formado

- AMUNT 30 SC, tiene un plazo de seguridad de 3 a 7 días para todos los cultivos, excepto maíz en grano que son 14 días

CULTIVO:	PLAGAS A CONTROLAR:	DOSIS Y OBSERVACIONES
Maíz <i>Zea Mays</i>	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	Aplicación foliar por pulverización: 125 mL/ha, 3 aplicaciones/campaña Aplicar con un 5% de emisión de pistilos (pelos) Se podrá repetir a los 7 días. Volumen 200 L/ha mínimo
Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Zapallo <i>Cucurbita pepo</i>	Gusano de la guía <i>Diaphania hyalinata</i> Gusano barrenador del fruto <i>Diaphania nitidalis</i> Heliothis <i>Heliothis spp</i>	Aplicación foliar por pulverización: 125 mL/ha, 3 aplicaciones/campaña desde quinta hoja verdadera desplegada hasta nueve flores con peciolo alargados, ya visibles en el tallo principal y con intervalo entre aplicaciones 10-14 días. Volumen 300-600 L/ha.
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i> Frijol <i>Capsicum annuum</i> Cebolla <i>Allium cepa</i>	Orugas y Gusanos cortadores <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Chrysodeixis chalcites</i> , <i>Agrotis spp</i> , <i>Trichoplusia ni</i> <i>Tuta absoluta</i>	Aplicación foliar por pulverización: 125 mL/ha, 3 aplicaciones/campaña desde la quinta hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta nueve ó más inflorescencias visibles y con un intervalo entre aplicaciones de 10-14 días. Volumen 300-800 L/ha.
Zanahoria <i>Daucus carota</i> Brécol Coliflor Repollo <i>Brassicae spp</i>	Orugas de la col (<i>Pieris brassicae</i> , <i>Plutella xylostella</i> , <i>Mamestra brassicae</i> <i>Pieris rapae</i>)	Aplicación foliar por pulverización: 85-100 mL/ha, 3 aplicaciones por campaña desde la quinta hoja verdadera desplegada hasta los primeros pétalos florales visibles pero con flores todavía cerradas y con un intervalo entre aplicaciones de 10-14 días. Volumen de 200-600 L/ha.

MODO DE ACCIÓN

Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, produciendo la interrupción de la transmisión del impulso nervioso, seguida de parálisis y muerte

Actúa sobre las hembras por ingestión y contacto evitando la ovoposición

Actúa sobre los huevos en la superficie de la hoja tratada y su eclosión

Actúa sobre nuevas fases larvianas o sobre las larvas, evitando su desarrollo

DOSIS

Pulverización foliar:

125 mL /ha



AMUNT 30 SC (Nº Reg. 8853 de 30 de Noviembre de 2017)
INSECTICIDA - OXADIAZINA
INDOXACARB

* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

* DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUALO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.



PRESENTACIÓN

Botellita de 100 mL

Botella de 500 mL

Botella de 1 L

Tambor 200 L