

**HERBICIDA**

# **BISFOX 40 SC**

# **BISPIRIBAC SODIO**

## **APLICACIÓN POST-EMERGENCIA**

**¡¡ACCIÓN SISTÉMICA Y  
SELECTIVA!!**



### **BENEFICIOS**

- \* Herbicida sistémico y de acción selectiva de baja dosis de aplicación
- \* El bispiribac-sodio es metabolizado por hidrólisis dentro de la planta y es degradado por microorganismos en el suelo

### **MODO DE ACCIÓN**

Se absorbe rápidamente por vía foliar y radicular. El bispiribac-sodio es absorbido fácilmente por el follaje y por las raíces y se trasloca por el floema y por el xilema. Las malezas sensibles al producto suspenden su crecimiento, se vuelven cloróticas, sus tejidos jóvenes mueren (necrosis) y, finalmente la maleza muere.

### **MOMENTO DE APLICACIÓN**

El producto debe ser aplicado 14 a, 21 días luego de emergidas las plántulas de arroz o con malezas en estado de 2 a 5 hojas verdaderas (gramíneas y ciperáceas) o en estado de roseta (latifoliadas), de hasta 10 cm. de diámetro, las mismas al estado de activo crecimiento para que se produzca una buena absorción y traslocación del producto previo a la entrada del agua de inundación.

### **DOSIS**

100 mL /ha

Usar un dispersante para una perfecta distribución del producto

Cultivo	Maleza:	Dosis (L/ha)	Momento de aplicación
Arroz <i>Oryza Sativa</i>	GRAMINEAS	0,1	El producto debe ser aplicado 14 a, 21 días luego de emergidas las plántulas de arroz o con malezas en estado de 2 a 5 hojas verdaderas (gramíneas y ciperáceas) o en estado de roseta (latifoliadas), de hasta 10 cm. de diámetro, las mismas al estado de activo crecimiento para que se produzca una buena absorción y traslocación del producto previo a la entrada del agua de inundación.  Añadir 200 mL/ha de dispersante
	Capín arroz ( <i>Echinochloa crusgalli</i> )		
	Liendre puerco o pasto colonial ( <i>Echinochloa colonum</i> )		
	Guarda rocío o pasto de cuaresma ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )		
	Espadilla ( <i>Corchorus orinocensis</i> )		
	LATIFOLIADAS		
Eclipta o botoncillo ( <i>Eclipta alba</i> )			
Barba de indio ( <i>Fimbristylis annua</i> )			
Tamarindillo ( <i>Aeschynomene indica</i> )			
Palo de agua o ludwigia ( <i>Ludwigia linifolia</i> )			
Falsa caminadora ( <i>Ischaemum rugosum</i> )			
CIPERÁCEAS Y COMELIACEAS			
Coquito o ciperio iria ( <i>Cyperus iria</i> )			
Chufa salvaje ( <i>Cyperus esculentus</i> )			
Piñita ( <i>Murdannia nudiflora</i> )			



**BISFOX 40 SC**, (N° Reg. 8852 de 30 de Noviembre de 2017)  
HERBICIDA  
BISPIRIBAC SODIO

- \* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
- \* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

\*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

\*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

\*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

\*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.



## PRESENTACIÓN

Botella 500 mL  
Botella 1 L  
Bidon 200 L