

INSECTICIDA

CIROX 75 WP

CIROMAZINA

¡¡INSECTICIDA TRIPLE EFECTO!!



TRIPLE EFECTO POR INGESTION

Efecto sobre larvas: Interfiere el proceso de muda

Efecto sobre pupas: Paraliza su desarrollo

Efecto sobre adultos: Inhibe la ovoposición de las hembras

TRIPLE EFECTO POR APLICACIÓN

Aplicado sobre la planta su acción es sistémica

Aplicado sobre las hojas tiene efecto translaminar

Aplicado sobre las raíces, se distribuye por la planta de forma ascendente



DOSIS

CULTIVO:	PLAGAS A CONTROLAR:	DOSIS RECOMENDADAS
Melon, <u>Cucumis melo</u> , Sandía, <u>Citrullus vulgaris</u> , Pepino, <u>Cucumis sativus</u> , Zapallo, <u>Cucurbita pepo</u>	Minadores de hoja <u>Liriomyza trifolli</u> <u>Liriomyza sativa</u>	Aplicación pulverización foliar : 50 g/ha, en tambor de 200 L En aplicación radicular, vía el agua de riego 200 – 250 g/ha
Papa, <u>Solanum tuberosum</u> Tomate, <u>Lycopersicon esculentum</u> Café, <u>Coffea arabica</u>	Larvas de <u>Liriomyza trifolli</u> Hembra adulta de <u>Liriomyza trifolli</u> Minador de la hoja del cafe <u>Lerucoptera spp</u>	Aplicación pulverización foliar : 50 g/ha, en tambor de 200 L En aplicación radicular, vía el agua de riego 200 – 250 g/ha
Lechuga, <u>Lactuca sativa</u> Cebolla, <u>Allium cepa</u> Zanahoria, <u>Daucus carota</u> Frijol, <u>Phaseolus vulgaris</u>	Minadores de hoja <u>Liriomyza trifolli</u> <u>Liriomyza sativa</u>	Aplicación pulverización foliar : 50 g/ha, en tambor de 200 L En aplicación radicular, vía el agua de riego 200 – 250 g/ha

MODO ADE ACCIÓN

CIROX es un insecticida por ingestión que puede ser aplicado mediante pulverización foliar o disolución en el agua de riego, para el control específico de *Liriomyza* spp. (minador de las hojas) en cultivos de cucurbitáceas (melón, pepino, sandía, zapallo), lechuga, frijol, habichuela, papa, tomate, chile, cebolla, flores y ornamentales.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Pulverizar tan pronto se observen las primeras minas en las hojas. Repetir la aplicación a intervalos de 7 a 14 días. No aplicar más de tres veces consecutivas

DOSIS

Pulverización foliar:
50 g/ bidón de 200 L

Riego por goteo: 200 a 250 g/ha disuelto en el agua de riego



CIROX 75 WP (Nº Reg. 1669 de 10 de Febrero de 2014)
INSECTICIDA - TRIAZINA
CIROMAZINA

PRESENTACIÓN

Bolsita de 50 gramos
Tambor 25 Kg

* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.