

INSECTICIDA

FENUR 5 EC

LUFENURON

¡¡PIRETROIDE DE EFECTO INMEDIATO!!

**RECOMENDADO CONTRA
PRIMEROS ESTADIOS LARVARIOS
(L1, L2)**



VENTAJAS

- FENUR 5 EC, ataca las larvas evitando que el insecto siga alimentandose
- FENUR 5 EC, para control de lepidópteros y trips en repollo y brassica ssp
- FENUR 5 EC, actúa rápidamente sobre los insectos evitando daños de importancia a los cultivos
- FENUR 5 EC, se puede usar en campo abierto y en invernadero

| Cultivo | Plaga | Dosis: L/ha | Condicionamientos |
|--|--|------------------|---|
| Maiz Zea Mays | Gusano de la mazorca Heliothis spp Gusano cogollero Spodoptera frugiperda | 120 mL/ha | Aplicar en pulverización normal al avivar los huevos o con la plaga en estado de larva en primeros estadios (L1-L2). |
| Patata Solanum tuberosum | Polilla de la papa Phthorimaea operculella | 400 mL/ha | |
| Repollo Brassica oleracea | Polilla del repollo Plutella xylostella Trips Frankliniella occidentalis | 400 mL/ha | Efectuar un máximo de tres aplicaciones a intervalos de 7-10 días, sobre huevos y larvas de los dos primeros estadios L1 y L2. Efectuar el tratamiento 1-2 semanas después del trasplante y repetir en caso de necesidad cada 7 días con un máximo de tres aplicaciones por ciclo de cultivo |
| Tomate Lycopersicon esculentum | Barrenador del fruto Heliothis spp Gusano cogollero Spodoptera frugiperda | 250-300 mL/ha | Efectuar un máximo de tres aplicaciones a intervalos de 7-10 días, sobre huevos y larvas de los dos primeros estadios L1 y L2. Aplicar desde el trasplante hasta la floración realizando de 1 a 3 tratamientos a intervalos de 7-10 días. |

DOSIS

Pulverización foliar: 250 a 400 mL/ha
Aplicación terrestre: 400 L de caldo/ha
Aplicación aérea: 60 L de caldo/ha

Aplicar el producto máximo tres veces por ciclo de cultivo y rotar con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico,

MODO DE ACCIÓN

Actúa sobre la enzima responsable del proceso de la formación de la quitina. Las larvas afectadas crecen internamente pero no mudan, muriendo atrapadas en su vieja cutícula.

Las hembras que ingieren el producto, lo transfieren a los huevos evitando la eclosión de nuevas fases larvianas

Actúa sobre las hembras por ingestión y contacto evitando la ovoposición
Actúa sobre nuevas fases larvianas o sobre las larvas, evitando su desarrollo



FENUR 5 EC (Nº Reg. 8853 de 30 de Noviembre de 2017)
INSECTICIDA - PIRETROIDE
LUFENURON

PRESENTACIÓN
Botella de 250 mL
Botella de 1 L
Tambor 200 L

* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.

