

FUNGICIDA

RIDOMAX 72 WP

MANCOZEB Y METALAXIL

¡! RÁPIDO Y RESIDUAL!!

**MEZCLA ASOCIADA DE UN FUNGICIDA
DE CONTACTO CON UN FUNGICIDA SISTÉMICO**



BENEFICIOS SINÉRGICOS DE LA MEZCLA

- * Fungicida sistémico y de contacto, de aplicación foliar, de rápida absorción foliar y prolongada acción residual.
- * Fungicida sistémico y de contacto con actividad preventiva, protectante y curativa.
- * No se necesita ni alternar ni mezclar con otros fungicidas de acción diferente.

MODO DE ACCIÓN

Asociación de fungicidas, con actividad por contacto y sistémica, para aplicar en pulverización foliar. Se caracteriza por la rápida absorción foliar del componente sistémico (metalaxil) y prolongada acción residual (estimada en 15 días) del mancozeb. Resulta efectivo por el control preventivo y protectante del mancozeb y curativo del metalaxil contra alternaria, antracnosis, numerosos mildius y otras enfermedades producidas por hongos endoparásitos.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Generalmente la aplicación de RIDOMAX 72 WP debe realizarse en la primera parte del ciclo de crecimiento del cultivo. La protección debe darse durante el periodo de floración y formación de frutos.

Se recomiendan dos aplicaciones, tres máximo por ciclo de cultivo. Melón, papa y tomate cada 30 días después de la siembra. Piña hasta tres aplicaciones máximo cada 30 días. Preferentemente no mezclar y no compatible con aceites en banano.

DOSIS

0.7 Kg/ha para melón; 1.4 Kg/ha para Solanáceas y 2 Kg/ha para papa
Piña: Ver cuadro de dosis

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino, <i>Cucumis sativus</i> Sandía, <i>Citrullus lanatus</i> Calabacita <i>Cucurbita pepo</i>	Mildiú veloso / <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0,7 Kg/ha	Generalmente la aplicación de RIDOMAX 72 WP debe realizarse en la primera parte del ciclo de crecimiento del cultivo. La protección debe darse durante el periodo de floración y formación de frutos. Se recomiendan dos aplicaciones, tres máximo por ciclo de cultivo. Melón, papa y tomate cada 30 días después de la siembra.
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío / <i>Phytophthora infestans</i>	2 Kg/ha	Piña hasta tres aplicaciones máximo cada 30 días
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Tizón tardío / <i>Phytophthora infestans</i>	1.4 Kg/ha	Preferentemente no mezclar y no compatible con aceites
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Mildiú veloso / <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	1.4 Kg/ha	
Piña <i>Ananas comosus</i>	Pudrición del corazón <i>Phytophthora parasitica</i>	Tratamiento de semilla: 3-3.5 g /L de caldo Etapa Vegetativa 4.5 Kg/ha	Realizar en etapa vegetativa 3 aplicaciones cada 30 días, después de sembrado el cultivo. Utilizar 2400 L/ ha de caldo



RIDOMAX 72 WP, (N° Reg. 9668 de 20 de Septiembre de 2019)
FUNGICIDA
MANGOZEB CON METALAXIL

* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 1 Kg
Bolsa de 5 Kg
Tambor de 25 Kg