

**PRE-EMERGENCIA**

**HERBICIDA**

# RIFIMAX 50 EC PRETILACLOR

**Inhibidor de la síntesis de ácidos grasos de cadena larga  
¡: POST -EMERGENCIA PARA MEZCLA CON PROPANIL !:**



## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- \* Selectivo del arroz,
- \* Buen control de malezas en especies de gramíneas y ciperáceas
- \* Inhibe la división celular en las malezas de los arrozales

## MODO DE ACCION

Son absorbidos, generalmente, por el coleóptilo o el epicótilo de las plántulas de las malezas, y les causan deformaciones morfológicas o les inhiben su crecimiento y, al final, la mayoría de ellas no emergen. Estos herbicidas son metabolizados por hidrólisis dentro de las plantas y son también adsorbidos por los coloides del suelo

## MOMENTO DE APLICACIÓN

Herbicida de acción preemergente para el control de malezas en arroz. Es selectivo al arroz en post-emergencia y puede ser aplicado en mezcla con propanil. Cuando se utiliza solo, se aplica al suelo en preemergencia; cuando se mezclan con propanil, son sinergistas que rompen la resistencia de Echinochloa sp. y se aplican en posemergencia del arroz, desde que las plantas emiten la primera hoja hasta que inician la etapa de macollamiento

## DOSIS

1,5 L/ha

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Ciperáceas	Coyolillo <i>Cyperus defformis</i>	1,5 L/ha
		Cortadera <i>Cyperus feraz</i>	
		Fimbristilis <i>Fimbristylis miliacea</i>	
	Gramíneas	Gramilla <i>Digitaria Spp</i>	
		Arrocillo <i>Echinochloa spp</i>	
		Pata gallina <i>Eleusine indica</i>	
		Ischaemun <i>Ischaemun rugosum</i>	
		Plumilla <i>Lepchloa spp</i>	
		Zacate amargo <i>Paspalum spp</i>	
		Cola de Zorra <i>Setaria geniculata</i>	
	Hoja ancha	Mozotillo <i>Bidens pilosa</i>	
		Cabeza pollo <i>Eclipsa alba</i>	
		Piñita <i>Murdannia nudiflora</i>	
		Sulfatillo <i>Ludwigia spp</i>	



**RIFIMAX 50 EC**, (N° Reg. 9486 de 7 de Marzo de 2019)  
**HERBICIDA**  
**PRETILACLOR**

\* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

\* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

\*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.  
 MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

\*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

\*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

\*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.

## PRESENTACIÓN

Bidón de 5 L  
 Bidón de 10 L  
 Bidón de 20 L  
 Bidón de 200 L