

INSECTICIDA

TRIVOTE 30 WG INDOXACARB

¡¡INSECTICIDA TRIVALENTE!!




TRIVALENTE EFECTO POR INGESTION

Efecto sobre larvas
Efecto sobre pupas
Efecto sobre adultos

TRIPLE EFECTO MEDIOAMBIENTAL

Respeta el ecosistema
Bajo impacto por su perfil compatible
Compatible con determinadas especies de fauna auxiliar



Cultivo	Plaga	Dosis
Arroz	Enrollador de la hoja <i>Cnaphalocrocis medinalis</i>	125-180 g/ha
Berenjena	Chinche, <i>Corythaica Passiflorae</i>	85-125 g/ha
	Oruga, <i>Heliothis armigera</i>	85-125 g/ha
Escarola	Gusano del repollo <i>Leptofobiaa aripa</i>	125 g/ha
Lechuga	Gusano soldado <i>Spodoptera spp.</i>	125 g/ha
Pimiento	Chinche <i>Nezara viridula</i>	85-125 g/ha
	Gusano del fruto <i>Spodoptera spp. Helicoverpa spp.</i>	
	Gusano alfiler <i>Keiferia lycopersicella</i>	85-125 g/ha
Tomate	Polilla del tomate <i>Tuta absoluta</i>	
	Gusano del fruto <i>Spodoptera spp. Heliothis armigera</i>	85-125 g/ha
	Gusano alfiler <i>Keiferia lycopersicella</i>	
Coliflor	Oruga, <i>Pieris brassicae</i>	85 g/ha
Brécol	Oruga <i>Pieris brassicae</i>	85 g/ha
Repollo	Palomilla plateada <i>Plutella xylostella</i>	
	Gusano del repollo <i>Leptofobia aripa</i>	85 g/ha
Pepino	Oruga <i>Solanum muricatum</i>	85-125 g/ha
Melón	Orugas, <i>Diaphania hyalinata Spodoptera latifascia</i>	125 g/ha
Sandía	Orugas, <i>Diaphania hyalinata y Spodoptera latifascia</i>	85-125 g/ha
Calabacín	Oruga, <i>Heliothis armigera</i>	85-125 g/ha
Papa	Gusano blanco <i>Premnotrypes vorax</i>	
	Gusano del alambre <i>Agriotes lineatus</i>	125 g/ha
	Polilla <i>Phthorimaea operculella</i>	
	Escarabajo <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	
Espinaca	Gusano del repollo <i>Leptofobia aripa</i>	125 g/ha
Maíz grano	Taladro <i>Ostrinia nubilalis</i>	125 g/ha
Maíz dulce	<i>Heliothis zea</i>	125 g/ha
Frutales de pepita	Carpocapsa <i>Cydia pomonella</i>	17 g/Hl
Platanera	Lagarta <i>Chrysodeixis chalcites</i>	4 g/Hl



MODO ADE ACCIÓN

Insecticida por Contacto e Ingestión. La actividad insecticida se produce por obstrucción de los canales de sodio en el sistema nervioso del insecto.


DOSIS

Pulverización foliar:
85 g a 125 g/ha

MOMENTO DE APLICACIÓN

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Berenjena, Escarola, Lechuga, Pimiento Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por ciclo de cultivo espaciadas 10-14 días.
Coliflor, Brécol, Repollo Sólo al aire libre. Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo espaciadas 10-14 días.
Pepino, Melón, Sandía, Calabacín, Papa Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por ciclo de cultivo espaciadas 10 días.
Espinaca, Maíz grano, Maíz dulce Sólo al aire libre.
Frutales de pepita Aplicar con un máximo de 1250 l/Ha de caldo (215 g/Ha. de producto)
Platano Sólo al aire libre. Dosis máxima de 215 g/Ha



TRIVOTE 30 WG (Nº Reg. 8617 de 21 de Junio de 2017)
INSECTICIDA - OXADIAZINA
INDOXACARB

* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.



PRESENTACIÓN

Bolsita de 50 gramos
Tambor 25 Kg