


HERBICIDA

TRONAMAX 75 WDG

METRIBUZINA

CONTROL MALEZAS ANUALES



HERBICIDA

- Se absorbe por raíces y hojas
- Actividad residual para especies monocotiledonas y dicotiledonas

SÍNTOMAS EN LA MALEZA

Actúa como fuerte inhibidor de la fotosíntesis

BENEFICIOS

- Alta selectividad a los cultivos de caña, tomate, papa y zanahoria, para un control eficaz de un amplio rango de malezas.
- Es traslocado a las partes leñosas de la planta cuando se aplica cerca de las hojas, alejándose del xilema, concentrándose en las raíces, tallos y hojas.
- El producto se descompone durante el ciclo del cultivo

DOSIS

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS	OBSERVACIONES
Caña de azúcar: <u>Sacharum officinarum</u>	Monocotiledonas Capin arroz: <u>Echinochloa crusgalli</u> Cola de zorro: <u>Setaria sp</u> Pasto de cuaresma: :: <u>Digitaria sanguinalis</u> Pasto de invierno: <u>Poa annua</u> Pasto moderado: <u>Leptochloa Uliformes</u> Pata de gallina: <u>Eleusine indica</u>	0,75 Kg/ha.	Aplicar antes de la brotación en los cultivos de más de dos años.
Papa: <u>Solanum tuberosum</u>	Dicotiledonas Albahaca silvestre: <u>Galinsoga parviflora</u> Alfilerillo: <u>Geranium mello</u> Apio cimarrón: <u>Apium leptophyllum</u> Bolsa de pastor: <u>Capsella bursapastoris</u> Capiquí: <u>Stellaria media</u> Cerraja: <u>Sonchus oleraceus</u> Chamico: <u>Datura Feroz</u> Chinchilla: <u>Tapetes minuta</u> Diente de león: <u>Taraxacum officinala</u> Falsa biznaga: <u>Ammi maius</u> Flor de pajarito: <u>Fumaria agraria</u> Llanten: <u>Plantago mayor</u> Malva cimarrona: <u>Anoda cristata (L.)</u> Manzanilla: <u>Matricaria chamomilla</u> Manzanilla cimarrona: <u>Anthemis cotula</u> <u>Chamaemelum cotula (L.)</u> Mastuerzo: <u>Coronopus didymus (L.)</u> Centinodia: <u>Poligonum aviculare</u> Sanguinaria: <u>Sanguinaria canadensis</u> Verdolaga: <u>Portulaca oleracea</u> Yuyo colorado: <u>Amaranthus quitensis</u>	0,75 Kg/ha.	Aplicar en Pre-emergencia al cultivo
Tomate <u>Lycopersicum esculentum</u>		0,75 Kg/ha	Aplicar en Pre- plantación inmediatamente después de la siembra o post-emergencia cuando ya está enraizado. Solo cultivo al aire libre
Zanahoria <u>Daucus carota</u>		1,15 Kg/ha	en Pre-emergencia mezclado con napropamida 45% a 2-3 Kg/ha
		0, 25 - 0, 35 Kg/ha	Aplicar en Post-emergencia del cultivo
Controla malas hierbas en preemergencia o post-emergencia temprana. Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, en cultivos al aire libre, diluyendo la dosis en 200-400 L de caldo / ha en una aplicación por campaña. No utilizar en terrenos muy arenosos.			

* Volumen de aplicación 400 L de agua

MOMENTO DE APLICACIÓN

Controla malas hierbas en preemergencia o postemergencia temprana. Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, en cultivos al aire libre, diluyendo la dosis en 200-400 L de caldo/ha en una aplicación por campaña. No utilizar en terrenos muy arenosos.

MODO DE ACCIÓN

TRONAMAX 75 WDG es un herbicida pre y post-emergente, sistémico, actúa como fuerte inhibidor de la fotosíntesis y su selectividad depende de la tolerancia de las plantas para degradar o metabolizar el compuesto. El proceso de absorción por las raíces ha sido descrito como un procesado de la difusión osmótica.

Es traslocado a las partes leñosas de la planta alejándose del xilema cuando se aplica cerca de las hojas, concentrándose en las raíces, tallos y hojas.

60 L aplicación aérea



TRONAMAX 75 WDG N° Reg. 8658 de 11 de Julio de 2017
HERBICIDA
METRIBUZINA

PRESENTACIÓN

Bolsita de 50 gramos
Bolsa de 500 gramos
Bolsa de 1 Kg
Tambor de 25 Kg

* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.

