

**HERBICIDA**

EL PODEROSO  
DE MALEZAS

# ZEUS 24 EC OXYFLUORFEN

PRESENTACIONES: 1L y 200L

## BENEFICIOS DE ZEUS

- Control de amplia gama de malezas
- Se puede mezclar con glifosato o paraquat
- Potencializa el efecto de herbicidas post emergentes
- Cultivos libres de malezas por periodos prolongados

## RECOMENDACIONES

- Lea la etiqueta del producto.
- Utilice ropa y equipo de protección.
- No contamine fuentes y reservas de agua.
- Lave la ropa de aplicación al finalizar la jornada de trabajo.



ZEUS<sup>®</sup>  
Oxifluorfen



Herbicida de contacto que controla un amplio espectro de malezas de hojas anchas y gramíneas; tiene acción pre-emergente de prolongada actividad residual. Actúa por contacto formando una barrera química residual en la superficie del suelo, evitando que las semillas de las malezas germinen. Se aplica en pre o post emergencia temprana.

**SIN MALEZAS MAS CULTIVOS**



## CONTROL DE MALEZAS EN LOS SIGUIENTES CULTIVOS:

Aguacate, Ajo, Algodón, Arroz, Banano, Berenjena, Brócoli, Cacao, Café, Camote, Caña India, Cebolla.

## EPOCA E INTERVALO DE APLICACIÓN

### CAFÉ, AGUACATE, BANANO:

En almácigos de café aplicar luego de la siembra del manquito y antes de que abra la copita, a razón de:

**5 ml/litro de agua**

**cubriendo toda la era**

En café establecido, si no hay malezas nacidas (pre emergencia) aplique Zeus solo. Si hay malezas nacidas es mejor aplicarlo en mezcla con glifosato o paraquat.

Con esto obtendrá un control de la maleza nacida (que esté en crecimiento y máximo 15 cm de altura) y además un efecto de sello en el suelo de hasta 90 días (dependiendo de la dosis).

La dosis de Zeus es de

**2.5 a 3 lts/Ha.**

**Mezclado con 2 a 3 lts /Ha. de glifosato o paraquat.**

## BROCOLI, COLIFLOR, REPOLLO

Aplicar en pre siembra un semana antes de la siembra, a la dosis de:

**2.5-3 lts /Ha.**

## MALEZAS QUE CONTROLA

Moriseco *Bidens pilosa*, Cardosanto *Argemone* spp, Santa Lucía *Argeratum conyzoides*, Bledo *Amaranthus* spp, Nabillo *Brassica campestris*, Canutillo *Commelina difusa*, Coyolillo *Cyperus* spp, Acedera *Oxalis stricta*, Cerrajilla *Sonchus oleraceus*, Comminillo *Mollugo verticillata*, Churristate *Ipomoea* spp, Chiquizacillo *Ricarda scabra*, Diente de León *Taxaracum officinale*, Escobilla *Sida* spp, Farolillo Chino *Physalis angulata*, Verdolaga *Portulaca oleracea*, Golondrina *Euphorbia hirta*, Hierba Mora *Solanum* spp, Lechuguilla *Sonchus oleraceus*, Mastuerzo *Lepidium* spp, Mielcilla *Galinsoga ciliata*, Ruibarbo *Rumex crispus*, Arrocillo *Digitaria sanguinalis*, Pata de Gallina *Eleusine indica*, Setaria *Setaria viridis*, Zacate de Guinea *Panicum maximum*, Abrojo *Senchus* sp.



## ZEUS 24 EC

HERBICIDA®

Herbicida de contacto que controla un amplio espectro de malezas de hojas anchas y gramíneas; tiene acción pre-emergente de prolongada actividad residual. Actúa por contacto formando una barrera química residual en la superficie del suelo, evitando que las semillas de las malezas germinen. Se aplica en pre o post emergencia temprana.

### EL PODEROSO EXTERMINADOR

### CONTROL DE MALEZAS EN LOS SIGUIENTES CULTIVOS:

Aguacate, Ajo, Algodón, Arroz, Banano, Berenjena, Brócoli, Cacao, Café, Camote, Caña India, Cebolla.

### MECANISMOS DE ACCIÓN

1. Los destructores de membranas celulares incluyen a las familias químicas:
  - a. bipyridilos,
  - b. difenileteres,
  - c. aril triazolinonas
  - d. fenil-phthalimidas.
2. Su acción principal es de contacto en post-emergencia y son activados al exponerse a la luz para formar compuestos a partir del oxígeno como el oxígeno simple, el radical libre de hidroxilo y el peróxido de hidrógeno. Estos compuestos destruyen las membranas celulares rápidamente y causan la necrosis de los tejidos.
3. Por su mecanismo de acción esta clase de herbicidas pueden dividirse en aceptores de electrones e inhibidores de la enzima protoporfirinogeno oxidasa (PPO oxidasa).

### DOSIS:

1 – 4 litros /ha (24 EC)

### Intervalo entre aplicaciones:

30 días

### MALEZAS QUE CONTROLA

Moriseco Bidens pilosa, Cardosanto Argemone spp, Santa Lucía Argeratum conyzoides, Bledo Amaranthus spp, Nabillo Brassica campestris, Canutillo Commelina difusa, Coyolillo Cyperus spp, Acedera Oxalis stricta, Cerrajilla Sonchus oleraceus, Comminillo Mollugo verticillata, Churrystate Ipomoea spp, Chiquizacillo Ricarda scabra, Diente de León Taxaracum officinale, Escobilla Sida spp, Farolillo Chino Physalis angulata, Verdolaga Portulaca oleracea, Golondrina Euphorbia hirta, Hierba Mora Solanum spp, Lechuguilla Sonchus oleraceus, Mastuerzo Lepidium spp, Mielcilla Galinsoga ciliata, Ruibarbo Rumex crispus, Arrocillo Digitaria sanguinalis, Pata de Gallina Eleusine indica, Setaria Setaria viridis, Zacate de Guinea Panicum máximum, Abrojo Senchrus sp.

ZEUS ES UN PRODUCTO AGROBUREAU, ESPAÑA.



ZEUS 24 EC, (Nº Reg. 1668 de 10 de Febrero de 2014)  
HERBICIDA  
OXYFLUORFEN

- \* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
- \* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

\*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

\*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

\*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

\*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.



### PRESENTACIÓN

Botella 1 y 5 L  
Bidón de 20 L  
Bidon 200 L