

PRE-EMERGENCIA

HERBICIDA

RASTAF 40 SC OXADIARGYL

HERBICIDA DE CONTACTO

Inhibe la formación de la clorofila en la maleza.

El herbicida que ejerce su
acción desde el momento de
la germinación



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- * Muy eficaz para control de Tomatillo (*Solanum Nigrum*)
- * Buen control de malezas en *Echinochloa crusgalli* *Echinochloa colonum*
- * Inhibe la formación de la clorofila

MODO DE ACCION

Actúa cuando atraviesa la lámina de agua con el herbicida depositada sobre el suelo, por contacto sobre el hipocotilo de la maleza, inhibiendo la formación de la clorofila,

MOMENTO DE APLICACIÓN

Se aplica en preemergencia, su acción se ejerce desde el momento de la germinación, al entrar en contacto la plántula con el suelo tratado con el herbicida.

DOSIS

ARROZ, CAFE y CAÑA 0.75 - 1 L/ha

CEBOLLA, AJO, TOMATE, PIMIENTO, REPOLLO, BROCOLI, COLIFLOR 1 - 1,5 L/ha

Cultivo	Plagas	Dosis	Observaciones
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Capin arroz <i>Echinochloa crusgali</i> Liendre de puerco <i>Echinochloa colonum</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Paja Peluda <i>Paspalum distichum</i> Pasto Guinea <i>Panicum fasciculatum</i> Agerantun azul <i>Ageratum chiriquense</i> Botón de oro <i>Melampodium sp.</i> , Oca amarilla <i>Oxalis barrelieri L.</i> Piñita <i>Murdannia nudiflora</i> Palo de agua <i>Ludwigia spp</i> Barba de Indio <i>Fimbristylis annua</i>	0,5- 0,75 l/ha	Pre-emergencia De 2 a 8 días después del primer riego de germinación, poco antes de la emergencia de la maleza
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarium</i>	Tomatitos, hierba mora <i>Solanum nigrum</i> Cadillo <i>Bidens pilosa</i> Yuyo <i>Amaranthus spp</i> Caminadora <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Pasto moderado <i>Leptochloa filiformis</i> Pasto cuaresm <i>Digitaria sanguinalis</i> Liendre de puerco <i>Sorghum halepense</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Lechosa o golondrina <i>Euphorbia sp.</i> Batajilla <i>Ipomoea spp</i> Croton <i>Astraea lobata</i> Hierba rastrea <i>Commelina difusa</i> Escobilla o Quiebra arados <i>Sida rhombifolia</i> Pajilla <i>Chloris radiata</i> Eclipta o botoncillo <i>Eclipta alba</i> Pega-pega <i>Desmodium tortuosum</i>	0,75- 1,0 l/ha	Aplicar en la pre-emergencia de malas hierbas, para el control de gramíneas y dicotiledóneas.
Café <i>Coffea arabica</i>	Pasto cuaresma <i>Digitaria sanguinalis</i> Caminadora <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Yuyo <i>Amaranthus spp</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Cadillo <i>Bidens pilosa</i> Clavelillo <i>Emilia sanchipholia</i> Borrea <i>Borreria latifolia</i>	0,75- 1,0 l/ha	Usar aspersora de presión retenida con pantalla protectora en el aguilón dirigiendo la aplicación a la maleza. Presión de descarga 20PSI con boquillas de baja descarga en abanico.
Cebolla <i>Allium cepa</i> Ajo <i>Allium sativum</i> Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i> Pimiento <i>Capsicum annum</i> Repollo var. <i>capitata</i> Brocoli var. <i>italica</i> Coliflor var. <i>botrytis</i> <i>Brassica oleracea</i>	Tomatillo, <i>Solanum nigrum</i> Quingüilla, <i>Chenopodium album</i> Bledo, <i>Amaranthus albus</i> Chamico, <i>Datura ferox</i> Verdolaga, <i>Portulaca oleracea</i> Rábano, <i>Raphanus raphanistrum</i> Bolsita del pastor <i>Capsella bursa-pastoris</i> Mostacilla <i>Rapistrum rugosum</i>	1-1.5 l/ha	En Pre-transplante, aplicar sobre suelo preparado. Considerar volumen de aplicación de 200 a 300 L de agua/ha. En Post-transplante, aplicar desde los 7 a 14 días después del transplante, cuando las malezas tengan hasta 1 a 2 hojas verdaderas



RASTAF 40 SC, (N° Reg. 10347 de 12 de Julio de 2021)
HERBICIDA
OXADIARGYL

* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.

PRESENTACIÓN

Bidón de 1L
Bidón de 5 L
Bidón de 20 L
Bidón de 200 L