

**INSECTICIDA**

# **RESET 5SG**

## **EMAMECTIN BENZOATO**



**Larvicida con efecto traslaminar**

**Causa parálisis inmediata y la larva deja de alimentarse para morir en 48 horas.**

**Muy selectivo en estadio de larva L1 y L2.**



## MODO DE ACCIÓN

RESET es un insecticida de acción por ingestión y contacto, no sistémico. Actúa provocando la interrupción de los impulsos nerviosos y pérdida de la función celular.

Control por ingestión y contacto directo sobre lepidópteros y otros minadores foliares en Tomate, Pimiento, Berenjena, Papa, Brócoli, Coliflor, Repollo, Col de Bruselas, Apio, Lechuga, Espinaca, Melón, Pepino, Sandía, Calabaza, Maiz y Banano con efecto fulminante sobre GUSANOS Y TALADROS L1, L2

Cultivo	Plagas	Dosis	Observaciones
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Gusano cogollero <i>Tuta absoluta</i>	200 g/ha	Iniciar la aplicación con umbral no superior al 10% de plantas afectadas.
Pimiento, Chile <i>Capsicum annuum</i>	Gusano afiler <i>Keiferia lycopersicella</i> , Barrenador de fruto <i>Neoleucino des elegantalis</i> Noctuel del tomate <i>Mythimna obsoleta</i>		Aplicar desde el avistamiento de la plaga
Maiz <i>Zea Mays</i>	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	200 g/ha	Aplicar en estado larval de la plaga L1 y L2 PC: 30 días
Repollo <i>Brassica oleracea var. capitata</i>	Taladro del maíz <i>Ostrinia nubilalis</i> Gusano elotero <i>Helicoverpa zea</i> , Polilla de dorso diamante <i>Plutella xylostella</i>	120 g/ha	Realizar la aplicación en la etapa de formación y cerrado cabeza, Aplicar si la presencia de mosca blanca sobrepasa el umbral de tolerancia
Brócoli <i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	Mariposita blanca de la col <i>Pieris rapae</i>		
Lechuga <i>Lactuca sativa</i>	Rosquilla de la col <i>Mamestra brassicae</i>		
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Gusano de la col <i>Helicoverpa rogatalis</i> ,		
Melón <i>Cucumis melo</i>	Gusano del melon <i>Diaphania hyalinata</i>	120 g/ha	Realizar un máximo de 3 aplicaciones con intervalo de 7 días desde la 1ª hoja verdadera del tallo principal, desplegada completamente.
Sandía <i>Citrullus lanatus</i>	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>		
Calabaza <i>Cucurbita máxima</i>	Calabacita <i>Agrotis spp</i>		
Calabacita <i>Cucurbita mostacha</i>	Gusano falso medidor <i>Trichoplusia ni</i>		
Calabacín <i>Cucurbita pepo</i>	Orugas del clavel <i>Cacoecimorpha pronubana</i>		
Pepino <i>Cucumis sativus</i>			

## MOMENTO DE APLICACIÓN

En melón, sandía y calabaza, realizar un máximo de 3 aplicaciones con intervalo de 7 días desde la 1ª hoja verdadera del tallo principal, desplegada completamente

No aplicar más de tres veces por campaña

## DOSIS

Pulverización foliar: 150 a 200 g/ha



## RESET 5 SG (Nº Reg. 10309 de 7 de JUNIO 2021) INSECTICIDA - EMAMECTIN BENZOATO

\* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

\* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

\*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

\*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

\*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

## PRESENTACIÓN

Sobre de 100gramos

Bolsa de 1 Kg

Tambor 25 Kg