

FUNGICIDA

FOSNAR 80 WP

FUNGICIDA SISTÉMICO DE "DOBLE VÍA"



DOBLE VÍA DE SELECTIVIDAD Y EFICACIA: COMPOSICIÓN

- 1) FOSETIL, parte aniónica (Tri-O-etilfosfonato).
- 2) ALUMINIO, parte catiónica (Al^{3+})

DOBLE VÍA DE DISTRIBUCIÓN:

- 1) ASCENDENTE POR EL XILEMA
- 2) DESCENDENTE POR EL FLOEMA

DOBLE VÍA DE ACCIÓN:

- 1) VIA DIRECTA, POR BLOQUEO MULTISITIO DE LA ESPOLURACIÓN DEL HONGO.
- 2) VIA INDIRECTA, POR ESTIMULACIÓN DE LAS DEFENSAS DE LA PLANTA.

DOBLE VÍA DE PROTECCIÓN:

- 1) PREVENTIVO DE LARGA DURACIÓN
- 2) CURATIVO DURANTE LOS 2-3 DÍAS POSTERIORES A LA INFECCIÓN

EFECTO POR APLICACIÓN:

Afecta a los sistemas de transporte y penetración en la pared del hongo.
Disminuye el metabolismo energético actuando sobre la respiración y producción de ATP.
Su acción MULTISITIO dificulta o imposibilita la aparición de resistencias.
Fuerte acción preventiva contra el crecimiento del micelio en el tejido de la planta.



DOSIS

Pulverización foliar

Aguacate: <i>Persea americana</i> Mill	Phytophthora spp Pudrición radicular y Pudrición de cuello, Marchitez, Tizón	Dosis entre 2 y 2.5 Kg/ha.
Café: <i>Coffea arabica</i> L		
Cucurbitáceas: Cucumis melo (melón), Citrullus lanatus (sandía) Cucumis sativus (pepino)	Pseudoperonospora cubensis Mildiu de las cucurbitáceas Phytophthora spp	
Chirimoyo: <i>Annona cherimola</i>	Phytophthora spp Pudrición radicular y Pudrición de cuello, Marchitez, Tizón	
Fresa: <i>Fragaria vesca</i>		
Mango: <i>Mangifera indica</i> ;		
Piña: <i>Ananas comosus</i> L		
Papaya: <i>Carica papaya</i>		
Papa: <i>Solanum tuberosum</i>		
Plátano: <i>Musa paradisiaca</i> ;	Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka negra) Phytophthora spp	
Pimiento: <i>Capsicum annum</i>	Phytophthora spp	
Tomate: <i>Lycopersicum</i> sculentus	Pudrición radicular y Pudrición de cuello, Marchitez, Tizón	
Yuca: <i>Manihot esculenta</i> , <i>Manihot utilissima</i> .	Phytophthora spp Pudrición radicular y Pudrición de cuello, Marchitez, Tizón	
Tabaco: <i>Nicotiana tabacum</i>	Marchitez, Tizón	

MOMENTO DE APLICACIÓN

Phytophthora

- Plantaciones: Programa de tres tratamientos a realizar, a dosis de 250 g/Hl., respetando siempre la dosis mínima de 25 g/árbol adulto.
- Viveros y jóvenes plantaciones: Debido al poco volumen foliar de las plantas jóvenes, utilizar una dosis de 300 g/Hl., aplicando el producto en pulverización foliar en intervalos de dos meses cada 15 días.

En caso de trasplante o plantación, se recomienda la inmersión de las raíces en un caldo conteniendo 2,5 g/l.

MODO DE ACCIÓN

FOSNAR 80 WP es un fungicida con actividad sistémica específico contra Oomicetos con acción multisitio en el interior del citoplasma



FOSNAR 80 WP N° Reg. 1696 de 23 de mayo de 2024
FUNGICIDA
FOSETIL-AL

* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.

PRESENTACIÓN

Sobre de 500 g

Bolsa de 1 Kg

Saco de 5 Kg

Tambor de 25 Kg

